論点

異常気象どうする

今夏、各地で「異常気象」が続いた。福岡、大分両県を中心に九州北部を襲った集中豪雨、迷走した台風5号、8月下旬まで続いた長雨と厳しい残暑などなど……。地球温暖化の影響で「日本の亜熱帯化」が指摘されるようになって久しいが、打つ手はないのか。この夏の経験から学ぶべき教訓と生き抜く知恵を探った。

観測記録上位塗り替え

国内各地で今夏、観測史上、上位の記録が相次いだ。九州北部豪雨では福岡県朝倉市や大分県日田市で7月5～6日の24時間雨量が各545.5%、370%と過去最高を記録。太平洋上で迷走後、本州を縦断した台風5号は発生から消滅まで18日189時間（7月21日～8月9日）と歴代3位の長寿。7月が猛暑となった東京では、8月に21日連続降雨という歴代2位の長雨を記録した。海外でも猛暑被害などが相次ぎ、米海洋大気局は「史上2番目の暑い夏」とみている。

重要性高まる「近所（助）力」

杉本 めぐみ
九州大助教

すぎもと・めぐみ
京都府出身。京都大院博士課程修了。在インドネシア日本大使館で政府開発援助（ODA）担当。東京大地震研究所特任研究員などを経て2014年から現職。専門は防災教育、災害リスクマネジメント。

7月5日昼ごろ、福岡県朝倉市や東峰村、大分県日田市などを襲った豪雨は、流域の住民や自治体に「過去に例がない」規模だった。5日だけで朝倉市で516ミリ、日田市で336ミリと、いずれも7月の平年月間合計を上回る記録的な降雨が短時間に山間部の集落を襲った。普段はせせらぎ程度の小川が数メートルに広がり、家や道路、橋を押し流して風景ごと一変させた。

災害発生直後、現地で捜索救助活動を行っていた陸上自衛隊の隊員の方々に話を聞いた。普段は見慣れた地形が一瞬にして変化し、どこに何があったのかも分からない状況だったという。

今回の九州北部豪雨は線状降水帯（積乱雲が帯状に連なる現象）による集中豪雨であった。線状降水帯は、梅雨前線や台風に伴って発生しやすいことが知られている。

線状降水帯による豪雨は、毎年どこかで発生しており、決して珍しいものではない。ただ、今回の豪雨は、過去の災害と比べても、雨量が桁違いに多かったことが特徴的だ。

気象庁によると、線状降水帯は、次々と発生する積乱雲が、ほぼ同じ場所を通過することで発生するという。今回の豪雨では、積乱雲が発生しやすい状態が、数日間にわたって維持されたことが、大雨の原因の一つとされている。

なぜ、このような状態が維持されたのか。現在、気象庁や研究機関などで、原因究明に向けた調査が進められている。

今後、地球温暖化が進んだ場合、線状降水帯による豪雨の発生頻度や雨量が増加するとの予測もある。

地球温暖化の影響が顕在化しつつある中、日本の平均気温は、100年間に約1・2度のペースで上昇している。地球全体では約0・7度なので、日本は世界平均よりも大きい。これは日本近海の水温上昇率が世界平均よりも高いためで、この気温上昇を背景に過去の豪雨と比較すると、豪雨の頻度や集中的な降雨に見舞われる頻度が増加傾向にあるという。同庁によると、最近30年間の猛暑日は1・3日／年と、1・5倍に増加。1時間50ミリ以上の短時間豪雨は1・5倍、1時間80ミリ以上は1・7倍に増加している。

さらに、1時間降水量50ミリ以上の短時間豪雨は、1976～2010年の35年間当たりで20・4回増加したのだ。

これは、将来どうなるのか。私はこの傾向が続くと考えている。温室効果ガスの排出がさらに増えるなどして気温上昇が加速すれば、異常高温の日数や極端豪雨の頻度は加速度的に増えるだろう。ただし、市民が変化を実感できるようになる、10年の短い期間で、どのくらい増えるかという定量的予測は現時点では難しい。短期間の変化には、温暖化による影響よりも、ラニーニャやエルニーニョなど海水温変動の変化や、大気の動きなどが大きく関係するためだ。

例えば、今年7月には梅雨明け前に積雲が続き、九州北部には豪雨による甚大な被害が出た一方、8月の関東甲信地方は長期間が続き、昨年の猛暑に比べ、気温は落ち着いていた。このように、短期間の現象を比べれば年によって変動が大きく、単純に年々「異常気象も集中豪雨が増えるわけではない。

とはいえ、温暖化に異常気象の関与の解明は進んでいる。我々のグループでも、コンピューターで温暖化が進んだ環境を再現し、二酸化炭素濃度が19世紀ごろの温暖化していない仮想の地球シミュレーションを試みている。二つの地球で偶然の異常気象の発生頻度を調べ、温暖化による異常気象の変化の傾向を調べるというアプローチだ。

現在、5～10年先の近い将来に起こる異常高温などの発生確率を示すような予測に挑戦している。

都市化が異常気象を助長している。廃熱などが都市部に集中し、ヒートアイランド現象で、数メートル程度の極めて狭小な範囲で雨が急激に強まることがある。多摩川の氾濫原に多くの人が住む都市部では、こうした雨雲が多く発生することが大きな被害に結びつく。

国連の「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」では、温室効果ガスの排出シナリオに応じた将来予測を行っている。九州北部豪雨のような線状降水帯の発生予測は、現在の気候モデルでは困難だ。

一方、「人間活動が過去の異常気象にどう寄与したか」や、「将来の地球でどう変わるか」という問いへの答えは、「ああだ、こうだ」と分かりやすい単純な形で伝えるのは難しい。これを補うため、「仮想地球」という概念を導入し、「人間活動がなかった地球」と「現在の地球」という二つの地球で比較することで、分かりやすい形で伝えるように工夫を凝らしているところだ。

【聞き手・渡辺諭】

渡部 雅浩
東京大大気海洋研究所教授



わたなべ・まさひろ
1971年神奈川県生まれ。東京大院博士課程修了。2007年9月から気象庁異常気象分析検討委員会作業部会長。15年度「日本地球惑星科学連合西田賞」。北海道大助教授などを経て16年12月から現職。

まず広めたい平易な理解

雨が激しくなる前段階で大雨の予報が後1時間には出ている。半日先には流域単位で大雨の予報が出ている。

若い人は傍観者ではない。自分の命を守るために避難する。周囲の人の避難を促す。テレビは地域の防災情報を伝える。ラジオは音を聞いてイメージを膨らませる。インターネットやスマホなどを使って情報を調べる。

これらの情報を総合的に判断して、避難するかどうかを決めるのは、あなたです。

雨による甚大な災害が出た一九年8月の関東地方長雨が続き、昨年の猛暑に比べ、気温は落ち着いていた。このように、短期間の現象を比べれば年によって変動が大きく、単純に年々「異常気象も集中豪雨が増えるわけではない。

とはいえ、温暖化に異常気象の関与の解明は進んでいる。我々のグループでも、コンピューターで温暖化が進んだ環境を再現し、二酸化炭素濃度が19世紀ごろの温暖化していない仮想の地球シミュレーションを試みている。二つの地球で偶然の異常気象の発生頻度を調べ、温暖化による異常気象の変化の傾向を調べるというアプローチだ。

現在、5～10年先の近い将来に起こる異常高温などの発生確率を示すような予測に挑戦している。

都市化が異常気象を助長している。廃熱などが都市部に集中し、ヒートアイランド現象で、数メートル程度の極めて狭小な範囲で雨が急激に強まることがある。多摩川の氾濫原に多くの人が住む都市部では、こうした雨雲が多く発生することが大きな被害に結びつく。

国連の「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」では、温室効果ガスの排出シナリオに応じた将来予測を行っている。九州北部豪雨のような線状降水帯の発生予測は、現在の気候モデルでは困難だ。

一方、「人間活動が過去の異常気象にどう寄与したか」や、「将来の地球でどう変わるか」という問いへの答えは、「ああだ、こうだ」と分かりやすい単純な形で伝えるのは難しい。これを補うため、「仮想地球」という概念を導入し、「人間活動がなかった地球」と「現在の地球」という二つの地球で比較することで、分かりやすい形で伝えるように工夫を凝らしているところだ。

【聞き手・渡辺諭】